

## LA BLATTE AMERICAINE

**ORDRE :** blattoptères

**FAMILLE :**

**ESPECES :** Blattes américaines



<b>DENOMINATION</b>	Blatte américaine ou Cancrelat.
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Long : de 30 à 40mm. Couleur du roux ferrugineux à marron. Une bande jaunâtre sur le bord du thorax. Ailes plus longues que le corps.
<b>HABITUDES, HABITAT</b>	Recoins sombres, chauds et très humides : animaleries, égouts, gaines de vide-ordures. Recherche la chaleur humide avec des résidus moisissés. Active dans les endroits sombres.
<b>DUREE DE VIE DE L'ADULTE</b>	De 6 à 10 mois.
<b>REGIME ALIMENTAIRE DE L'ADULTE</b>	Se nourrit de toute matière organique avec une préférence pour les produits moisissés y compris les crottes des autres animaux.
<b>FECONDITE</b>	De 7 à 12 oothèques/femelle - de 20 à 28 oeufs/oothèques.
<b>DEVELOPPEMENT LARVAIRE</b>	Environ 10 mois.
<b>REGIME ALIMENTAIRE DES LARVES</b>	Même nourriture que les adultes.
<b>CYCLE DE DEVELOPPEMENT</b>	De 10 à 12 mois.
<b>DEGATS SUR MATERIELS</b>	Grignote les emballages minces en papier ou en plastique. Tâches sur emballages avec les déjections.
<b>RISQUES SANTE ANIMALE ET HUMAINE</b>	Vecteur de moisissures, de bactéries, de virus et de certains vers intestinaux responsables de certaines maladies.